

Российская академия наук
Уральское отделение
Институт экологии растений и животных
Уральское орнитологическое общество

МАТЕРИАЛЫ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ

П Т И Ц

НА УРАЛЕ, В ПРИУРАЛЬЕ
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Выпуск 14

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2009

УДК 598.2:591
М 341

*Сборник издан на средства Программы
Президиума Российской академии наук № 23
«Биологическое разнообразие»*

Ответственные редакторы:
доктор биологических наук
В. К. Рябицев,
кандидат биологических наук
В. В. Тарасов

Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и
М 341 Западной Сибири : [сб. ст. и крат. сообщ. / отв. ред. В. К. Рябицев,
В. В. Тарасов]. Вып. 14. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та,
2009. — 252 с.

ISBN 978-5-7996-0479-0

Четырнадцатый выпуск сообщений с новыми данными о местах гнездования, зимовки, путях миграций и залетах птиц, статьи с полным обзором орнитофауны отдельных территорий.

Сборник предназначен для орнитологов, биогеографов, преподавателей биологических факультетов, любителей птиц.

УДК 598.2:591

ISBN 978-5-7996-0479-0

© Институт экологии растений
и животных, 2009
© Рябицев В. К., обложка, 2009

ПТИЦЫ СЕВЕРНЫХ ОКРАИН И ОКРЕСТНОСТЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА (ПО ДНЕВНИКАМ НАБЛЮДЕНИЙ Ю. К. ГУСЕВА)

© **В. А. Коровин**

Уральский государственный университет, кафедра зоологии,
пр. Ленина, 51, г. Екатеринбург, 620083; vadim_korovin@mail.ru

Ю. К. Гусев родился 19 января 1934 г. в г. Свердловске. Окончил Свердловский горный институт. После окончания работал в геологических партиях, участвовал в экспедициях. Приблизительно с 1958 г. и до выхода на пенсию в 1999 г. работал в НИИтяжмаш при Уралмашзаводе. С конца 1980-х гг. был членом Уральского орнитологического общества. С юных лет Юрий Константинович увлекался ловлей и содержанием певчих птиц, рыбалкой, охотой, но главным увлечением всей его жизни были наблюдения за птицами в природе. Уже в школьные годы он записывал свои наблюдения в дневник, который не прекращал вести до конца своей жизни. Стиль его дневниковых записей окончательно сформировался в середине 60-х гг. Отличительная его особенность — строгая документальность информации: всегда четко указаны дата и маршрут экскурсии, погодные условия, нередко — фенологическая фаза развития природы. Встреченные виды перечисляются, как правило, в полном объеме, а не только те, что привлекли особое внимание. Это, в частности, позволяет рассчитать по его дневникам средние даты прилета птиц в район наблюдений и даты их осеннего отлета. При всей краткости записей автор обращает внимание на многие тонкие детали, нередко ускользающие от внимания наблюдателей. Так, он постоянно фиксирует волны появления в городе «чистых» больших синиц (т. е. недавно прикочевавших из природных местообитаний), сроки весеннего потемнения клювов у самцов домовых воробьев, предзимнее обустройство ими гнезд в качестве мест ночевки и т. д. С самых первых лет ведения дневника Ю. К. Гусев строго придерживался методических рекомендаций, приводимых в зоологической литературе, — записи вел простым карандашом, только на одной стороне листа. Все перечисленные особенности позволяют рассматривать материалы дневников Ю. К. Гусева в качестве первичных научных данных. Постоянная территория его наблюдений — городской район Уралмаш и прилегающие к нему северные предместья — Шувакишский лесопарк, оз. Шувакиш, р. Пышма к югу от г. Верхняя Пышма, с. Пышма, пос. Садовый, водоочистные сооружения. Реже посещались Верх-Исетский пруд, озера Шарташ и Балтым, оз. Вашты, окрестности городских районов Эльмаш и Веер, Калиновский лесопарк и р. Калиновка. Периодичность экскурсий — несколько раз в не-

делю: даже не имея возможности совершить дальний выход за город, он стремился посетить хотя бы прилегающий к его окраине лесопарк, где для птиц были установлены постоянные кормушки, или ближайший городской парк. С выходом Юрия Константиновича на пенсию экскурсии стали практически ежедневными.

На сегодняшний день дневники наблюдений Ю. К. Гусева, охватывающие более чем полувековой период, являются наиболее полным источником сведений о фауне птиц северных окраин и предместий Екатеринбурга, а также о ее изменениях на протяжении 2-й половины XX в. Совершенно очевидно, что только их автор мог бы сделать полноценный обзор птиц этой территории. К сожалению, по каким-то причинам этого не случилось. Тем не менее Ю. К. Гусев создавал, что его дневники представляют научный интерес, и незадолго до своей кончины в октябре 2007 г. просил передать их на кафедру зоологии Уральского государственного университета.

Цель, которую ставил перед собой автор настоящего обзора, — сделать результаты более чем полувековых наблюдений Ю. К. Гусева доступными для широкого круга уральских орнитологов и тем самым отдать дань памяти человеку, на протяжении всей своей жизни сохранившему живой интерес и любовь к птицам.

Приношу свою благодарность А. Н. Степанчуку — спутнику Ю. К. Гусева во многих совместных экскурсиях, который помог уточнить «географию» района наблюдений, высказал ряд комментариев по рукописи, и в рассказах которого автор дневников предстает живым и интересным человеком.

* * *

Черношейная поганка *Podiceps nigricollis*. В дневниках Ю. К. Гусева не упоминается. Встреча этого вида на оз. Шувакиш зарегистрирована С. Н. Уткиным, на персональной фотовыставке которого приведен снимок черношейной поганки в брачном наряде, запутавшейся в рыболовной сети (см. его заметку в настоящем сборнике). Ближайшее установленное место гнездования вида находится в Каменском р-не Свердловской обл. (Бельский, Ляхов, 1995). Требуется выяснение характера пребывания черношейной поганки на оз. Шувакиш.

Красношейная поганка *P. auritus*. В дневниках, в отличие от чомги, за редкими исключениями, называется просто «поганкой». Не вызывает сомнения, что под этим названием упоминается именно красношейная поганка, наиболее обычная на Среднем Урале. Гнездится на оз. Шувакиш (в отдельные годы отмечено до 10 и более гнезд), на

пруду в с. Пышма, по торфяным разрезам и небольшим постоянным водоемам вдоль р. Пышма.

Большая поганка *P. cristatus*. Почти все упомянутые в дневниках встречи относятся к периодам кочевок и пролета (май, сентябрь–октябрь). На оз. Шарташ в октябре отмечены скопления до 30 особей, на оз. Шувакиш и пруду в с. Пышма — одиночки и небольшие группы. Сведения о гнездовании отсутствуют.

Большая выпь *Botaurus stellaris*. Вероятно, гнездится на оз. Шувакиш, судя по встречам в гнездовое время и регистрации токовых криков.

Малая выпь *Ixobrychus minutus*. За весь многолетний период наблюдений упоминается единственная встреча: 16 июля 1998 г. отмечена малая выпь, низко пролетевшая вдоль берега оз. Шувакиш.

Серая цапля *Ardea cinerea*. Кочующие особи неоднократно отмечались по р. Пышма, на отстойниках водоочистных сооружений, оз. Шувакиш. Гнездование этого вида на оз. Шувакиш в 2008 г. установлено С. Н. Уткиным, включившим в экспозицию персональной фотовыставки (апрель 2009 г.) серию снимков взрослых птиц, расположенного на залеме тростника гнезда и птенцов серой цапли (Уткин, настоящий сборник).

Гуси *Anser sp.* Неоднократно весной и осенью отмечались пролетные стаи гусей над северной окраиной города (Уралмаш) и оз. Шувакиш, величиной от 8–10 до 150–200 особей. В двух случаях (10 мая 1982 г. и 11 апреля 1986 г.) акцентируется внимание на высокой тональности их голосов: «тонкий протяжный писк-свист»; «крик, похожий на мяуканье котенка», что с большой долей вероятности позволяет предположить их принадлежность **пискульке** *A. erythropus*.

Лебедь-шипун *Cygnus olor*. В районе наблюдений регистрировались редкие залеты. Два шипуна отмечены 31 мая 1984 г. на заводи р. Пышма между окраиной Екатеринбурга и г. Верхняя Пышма. Позже, с 3 по 21 июня, здесь постоянно держался один лебедь. На протяжении 3 месяцев — с первых чисел августа до начала декабря 1988 г. — на пруду в с. Пышма находился одиночный шипун, покинувший водоем только с ледоставом. По версии Ю. К. Гусева, он проводил здесь линьку.

Лебедь-кликун *C. cygnus*. Изредка на окрестных водоемах регистрируются пролетные кликуны. Так, 6 лебедей пролетели над оз. Балтым 10 июля 1971 г.; стая из 20 лебедей отмечена 31 мая 1994 г. на оз. Шувакиш; 6 лебедей (с ними 1 гусь) пролетели над оз. Шарташ 24 октября 1998 г.

Кряква *Anas platyrhynchos*. Одна из самых обычных речных уток. В последние годы все чаще отмечается зимовка крякв на незамерзающих участках водоемов. Первый такой случай зарегистрирован на пруду

в с. Пышма 21 января 1984 г. Здесь же 1–2 кряквы держались на сливе из пруда весь декабрь 1997 г., 3 пары наблюдались 14 февраля 2001 г., до десятка особей — на протяжении декабря 2001 и 2002 гг., около 5 — с конца ноября до конца декабря 2003 г., а также в январе 2004 г.

Чирок-свистунок *A. crecca*. Обычный гнездящийся вид.

Серая утка *A. strepera*. Редка. Три особи встречены на р. Пышма 17 сентября 1988 г.

Шилохвость *A. acuta*. Обычна на оз. Шувакиш. На прибрежных лугах неоднократно находили ее гнезда, на водоеме отмечали выводки.

Чирок-трескунок *A. querquedula*. Сравнительно немногочислен. В начале 1950-х гг. добывался на оз. Шувакиш, найдены гнезда, в значительном количестве отмечен на р. Калиновка.

Широконоска *A. clypeata*. Довольно обычна на оз. Шувакиш, хотя уступает в численности крякве и шилохвости. Найдены гнезда и выводки.

Красноголовая чернеть *Aythya ferina*. Наиболее обычна из нырковых уток на местных водоемах. Выводки отмечены на прудах в с. Пышма и пос. Садовый, на оз. Шувакиш.

Хохлатая чернеть *A. fuligula*. Довольно обычна. Гнезда и выводки находили на оз. Шувакиш, кроме того, выводки отмечены на пруду в с. Пышма.

Морская чернеть *A. marila*. Зарегистрирована на осеннем пролете в октябре.

Обыкновенный гоголь *Bucephala clangula*. Изредка регистрировались пролетные особи. Так, пара и 2 самца отмечены на пруду в с. Пышма 4 мая 1989 г., на этом же водоеме гоголи встречены в октябре 1976 г.

Обыкновенный турпан *Melanitta fusca*. В октябре 1986, 1994 и 1996 гг. на оз. Шарташ отмечены стаи черных уток, предположительно — турпанов.

Длинноносый *Mergus serrator* и **большой** *M. merganser* **крохали**. Единичные встречи крохалей (вид не указан) отмечены в периоды осенней миграции.

Скопа *Pandion haliaetus*. За весь период наблюдений зарегистрирована дважды: 14 сентября 1976 г. отмечена скопа, пролетавшая высоко над оз. Шувакиш; 9 мая 1996 г. наблюдали охоту скопы в центре оз. Шарташ.

Обыкновенный осоед *Pernis apivorus*. За все время зарегистрирован лишь трижды. Две встречи с недельным интервалом произошли в 1-й половине сентября 1987 г. на опушке леса у оз. Шарташ. Птица подпускала очень близко — предположительно, молодая. Еще 1 осоед встречен 10 августа 1996 г. в Шувакишском лесопарке.

Чёрный коршун *Milvus migrans*. Довольно обычен в окрестностях города, залетает и на его окраины. Расположенное на сосне гнездо, содержавшее 3 яйца, найдено 16 мая 1949 г.

Полевой лунь *Circus cyaneus*. Чаще регистрировался в периоды миграций. Гнездовые находки отсутствуют.

Луговой лунь *C. pygargus*. В дневниках упоминается гораздо чаще полевого. Встречи приурочены к заболоченным берегам оз. Шувакиш и р. Пышма, охватывают период с середины апреля по конец июля. Признаков гнездования не отмечено. Возможно, по крайней мере часть этих встреч относится к полемому луню.

Болотный лунь *C. aeruginosus*. Наиболее обычный из луней в районе наблюдений. Изредка отмечался в 60–70-е гг. прошлого века, с конца 80-х гг. встречается практически ежегодно и, очевидно, гнездится. Регистрировался в период с 19 апреля по 14 августа. Основные места обитания — оз. Шувакиш и заросшие тростником пруды на р. Пышма. Наличие гнезд предполагалось в постоянных местах посадки в тростниковые заросли, а в августе неоднократно наблюдались еще не распавшиеся выводки.

Тетеревятник *Accipiter gentilis*. Сравнительно обычен, встречается на протяжении всего года как по окраинам города (оз. Шувакиш, р. Пышма, окрестные леса), так и непосредственно в городских кварталах. Отмечалась охота тетеревятника на чирков, сорок, однако чаще всего — на сизых голубей.

Перепелятник *A. nisus*. Обычен. Многие перепелятники вблизи города живут оседло либо прикочевывают к городу на зимовку — в дневниках преобладают упоминания зимних встреч, с декабря по февраль. Нередко залетает и непосредственно в город (около трети всех регистраций). Около ж/д станции Красногвардейский 3 августа 1991 г. наблюдался еще не распавшийся выводок.

Зимняк *Buteo lagopus*. Изредка регистрируется на пролете, чаще осенью — с конца сентября до начала ноября. Весной отмечен 2 мая 1997 г.

Обыкновенный канюк *B. buteo*. Обычный гнездящийся вид пригородных лесов.

Большой подорлик *Aquila clanga*. На оз. Шувакиш и окружающих болотах в 60–70-е гг. прошедшего столетия зарегистрировано до десятка встреч — как в периоды миграций, так и в летнее время. Последний раз отмечен 23 апреля 1986 г. Очевидно, все особи были пролетными или кочующими.

Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla*. Дважды отмечены пролетные птицы: над оз. Шарташ 2 ноября 1986 г. и оз. Шувакиш 20 мая 1995 г.

Сапсан *Falco peregrinus*. Редок. В дневниках содержатся сведения о 6 встречах, при этом 4 из них приходится на 1960-е гг. Последний раз отмечен в конце августа 1977 г. Регистрировался в бесснежный период года — с мая по октябрь. Дважды отмечен в городе, в том числе над территорией Уралмашзавода. Как правило, наблюдались одиночные птицы, только 22 июня 1966 г. видели 4 особей, скорее всего, родителей с молодыми, паривших над болотом у оз. Шувакиш.

Чеглок *F. subbuteo*. Наиболее обычный из соколов в районе наблюдений. Регистрировался практически ежегодно, с 3-й декады апреля по начало сентября. Почти половина всех встреч зафиксирована непосредственно на территории города, которую этот сокол регулярно использует для охоты. В 2000–2002 гг. гнезвился в городском парке района Уралмаш. Гнезда располагались в старых вороньих постройках на высоких соснах. В августе неоднократно наблюдали семейные группы — взрослых с молодыми. Многие чеглоки, населяющие эту местность, специализировались на добычании черных стрижей.

Кобчик *F. vespertinus*. В дневниках имеется единственное упоминание вида: 22 мая 1976 г. отмечены кобчики в полете над оз. Шувакиш.

Обыкновенная пустельга *F. tinnunculus*. Немногочисленна, регистрировалась значительно реже чеглока. Найдено несколько гнезд, дважды они располагались, предположительно, в нишах строений.

Тетерев *Lyrurus tetrix*. В дневниках отмечается до середины 1970-х гг. Наиболее часто упоминаемые места встреч — болото к северу от оз. Шувакиш, а также местность к юго-западу от оз. Балтым: урочище Насосная, Шум-болото, окрестности пос. Красногвардейский. В апреле — первой половине мая отмечали токование. В молодости, будучи охотником, Ю. К. Гусев сам неоднократно добывал здесь косачей.

Глухарь *Tetrao urogallus*. Отмечен лишь во время относительно дальних выездов из города.

Рябчик *Tetrastes bonasia*. Наиболее обычный представитель куриных в пригородных лесах. Неоднократно встречены выводки разного возраста.

Перепел *Coturnix coturnix*. Редок. Токовые крики отмечали на лугах у оз. Шувакиш и пос. Садовый, на полях у с. Пышма.

Серый журавль *Grus grus*. Изредка регистрировали в районе оз. Шувакиш — обычно в полете, реже отмечали кормящихся на болоте. 17 мая 2003 г. отмечен журавль, паривший высоко над площадью района Уралмаш.

Пастушок *Rallus aquaticus*. В своих дневниках Ю. К. Гусев упоминает о встречах пастушка довольно часто, он отмечает его на оз. Шу-

вакиш и прудах по р. Пышма, как по голосу, так и визуально (к сожалению, без описания конкретных признаков). Вряд ли это название употребляется в качестве синонима для коростеля и погоныша, которые обычно называются своими именами. Версия об использовании названия «пастушок» в качестве собирательного для всех пастушковых, не определенных до вида, также не вполне убедительна, поскольку нередко оно приводится в перечислении с другими представителями семейства («слышал коростеля, пастушка»; «видели пастушка, болотную курочку»; «видел пастушка и лысуху») и, судя по контексту, явно относится к конкретному виду. В то же время до сих пор пастушок в окрестностях Екатеринбурга не зарегистрирован, а ближайшие установленные места его обитания (и вероятного гнездования) — оз. Маян в Кунашакском р-не Челябинской обл. (Кузьмич и др., 2005) и оз. Малый Сунгуль в Каменском р-не Свердловской обл. (Бойко, Сысоев, 2001) — удалены от Екатеринбурга на 75–110 км. Поэтому чтобы поставить новую точку на карте видового ареала, требуются весомые аргументы — добытая птица, фотография, находка гнезда или, по меньшей мере, детальное описание внешнего вида и голоса птицы. Таким образом, этот вопрос еще ждет своих исследователей.

Погоныш *Porzana porzana*. Немногочислен, встречается по заболоченным берегам оз. Шувакиш и р. Пышма. Отмечался по токовым крикам, реже — визуально. На оз. Шувакиш 21 мая 1966 г. найдено яйцо, предположительно, этого вида (размеры 31 × 24 мм).

Погоныш-крошка *P. pusilla*. В записи от 7 августа 1981 г. вместе с погонышем упоминается «малая курочка», которая «трещит». Судя по характерному крику, наиболее вероятен именно погоныш-крошка. Птица встречена в районе коллективных садов перед оз. Шувакиш.

Коростель *Crex crex*. Практически ежегодно отмечался по токовым крикам на лугах, реже — на полях. На осоковом болоте найдено гнездо.

Камышница *Gallinula chloropus*. Упоминается лишь дважды: 1 сентября 1974 г. и 5 августа 1985 г., обе встречи — на оз. Шувакиш. Еще несколько раз говорится о болотной курочке, в частности 27 июля 1974 г. — «размером почти с лысуху». Возможно, речь в этих случаях также идет о камышнице.

Лысуха *Fulica atra*. Первые встречи ее в районе наблюдений зафиксированы в 1977 г. Неупоминание лысухи в предыдущий период, скорее всего, указывает на ее отсутствие, поскольку Ю. К. Гусев, будучи охотником, неоднократно выезжал на озера Челябинской обл., где этот вид многочислен и, судя по всему, был ему хорошо знаком. Позже несколько раз зарегистрирована в 1980-е гг., а с 1990-х встречается

ся уже регулярно. Эти данные, очевидно, отражают процесс расселения вида в регионе. На оз. Шувакиш и прудах по р. Пышма встречалась с середины мая по 1-ю декаду сентября. На этих же водоемах в период с 22 июня по 17 августа отмечали выводки.

Тулес *Pluvialis squatarola*. Редкий пролетный вид. За весь период наблюдений отмечен трижды. На оз. Шувакиш стайки тулесов встречены 25 мая 1977 г. и 21 мая 1978 г. В расположении коллективных садов (на лужах) 3 тулеса отмечены 25 мая 1980 г.

Галстучник *Charadrius hiaticula*. Упоминается единственный раз: 4 галстучника встречены 13 сентября 1996 г. на оз. Шарташ.

Малый зуек *Ch. dubius*. В небольшом количестве найден на гнездовании в районе рек Калиновка и Пышма — на отстойниках очистных сооружений, отвалах песка, площадке под строительство парников, а также на оз. Шарташ.

Чибис *Vanellus vanellus*. Обычен. Гнездится по заболоченным лугам в районе оз. Шувакиш, р. Пышма, на сельскохозяйственных полях.

Черныш *Tringa ochropus*. В небольшом количестве гнездится по окруженным лесом водоемам.

Фифи *T. glareola*. На местных водоемах весьма обычен в периоды пролета. Встречи сильно беспокоившихся пар в летнее время (4 июля на оз. Шувакиш, 13 июня на водоочистных сооружениях) позволяют предполагать редкие случаи гнездования.

Большой улит *T. nebularia*. Немногочислен, чаще встречался в периоды пролета. Пара с птенцами отмечена на оз. Шувакиш 7 июня 1964 г.

Травник *T. totanus*. Обычен. Гнездится по сырым берегам оз. Шувакиш, р. Пышма. Неоднократно находили гнезда и птенцов.

Поручейник *T. stagnatilis*. Обычен по заболоченным берегам и окрестностям оз. Шувакиш, особенно в 1970-е гг. Найдено не менее десятка гнезд.

Перевозчик *Actitis hypoleucos*. Немногочислен. Пара, предположительно с птенцами, отмечена на свалке в районе с. Калиновка.

Мородунка *Xenus cinereus*. Регулярно регистрируется с 80-х гг. прошедшего века. Очевидно, гнездится: на пруду в с. Пышма, на отстойниках очистных сооружений, где отмечали токование, а в летнее время — активное беспокойство.

Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus*. Останавливается на местных водоемах — оз. Шувакиш, пруду у с. Пышма, отстойниках очистных сооружений — в периоды миграций. Весной встречается с последних чисел мая до середины июня, затем появляется иногда

уже в июле, но обычно — в августе, реже — в 1-й половине сентября. Стаи насчитывали от нескольких особей до 30–50 птиц.

Турухтан *Philomachus pugnax*. Обычен, в некоторые годы многочислен на весеннем пролете во 2-й половине мая. В июне–июле, по-видимому, встречаются уже местные или летующие птицы. В августе не зарегистрирован. В дневниках приводится несколько свидетельств гнездования турухтана. Токование самцов наблюдали не только в мае, но и в июне, в последнем случае отмечено присутствие самок. Запись от 23 мая 1970 г. гласит: «Турухтаны строят гнезда». Наконец, 28 мая 1969 г. на оз. Шувакиш найдено гнездо с кладкой из 4 свежих яиц (размеры 42 × 31 мм).

Кулик-воробей *Calidris minuta*. Небольшие пролетные стайки регистрировались в августе на озерах Шувакиш и Шарташ, по р. Пышма.

Краснозобик *C. ferruginea*. Упоминается единственный раз: 9 июня 1979 г. встречена стайка из 10–15 «мелких куликов, похожих на краснозобика».

Гаршнеп *Limnocyptes minimus*. В дневнике имеется единственное упоминание: 15 мая 1964 г. на оз. Шувакиш «спугивал бекасов, гаршнепов».

Бекас *Gallinago gallinago*. Обычен по сырым лугам, заболоченным берегам водоемов.

Дупель *G. media*. В небольшом количестве встречался по заболоченным берегам оз. Шувакиш, р. Пышма, более регулярно — в 60–70-е гг. прошлого века. Последние встречи отмечены в 2000 г. На оз. Шувакиш несколько раз наблюдалось вечернее токование, а 29 мая 1965 г. найдено гнездо с полной кладкой.

Вальдшнеп *Scolopax rusticola*. Упоминается только в связи с охотой на тяге в начале 1950-х гг., когда было добыто несколько экземпляров.

Большой кроншнеп *Numenius arquata*. В районе наблюдений, чаще всего — на оз. Шувакиш, изредка отмечались кочующие или пролетные особи.

Большой веретенник *Limosa limosa*. Редок. В некоторые годы встречался на оз. Шувакиш, где отмечено токование, а 19 мая 1970 г. найдено гнездо, содержавшее 5 свежих яиц.

Малая чайка *Larus minutus*. На оз. Шувакиш наиболее регулярно поселялась во 2-й половине 1980-х гг.: отмечали токование, найдены гнездовые колонии. В некоторые годы встречена только на пролете и кочевках — на упомянутом озере и пруду в с. Пышма, а во многие годы вообще не регистрировалась.

Озёрная чайка *L. ridibundus*. Наиболее обычна из чаек в районе

наблюдений. Гнездовые колонии отмечены на оз. Шувакиш и прудах по р. Пышма.

Серебристая чайка *Larus argentatus sensu lato*. Используя приводимую в определителях систематику и номенклатуру, крупных белоголовых чаек Ю. К. Гусев относил к виду «серебристая чайка», лишь несколько раз используя название «хохотунья». Ревизия этой группы, проведенная в последние годы, подразделяет «серебристую чайку» в широком смысле на несколько самостоятельных видов (Степанян, 2003; Коблик и др., 2006; Рябицев, 2008). Имеющаяся в дневниках информация позволяет с достаточными основаниями говорить о двух нижеприведенных видах.

Восточная клуша *L. heuglini*. В октябре, нередко уже перед ледоставом, на озерах Шувакиш и Шарташ отмечены крупные чайки с темной мантией, очевидно, пролетные. Наиболее вероятно их принадлежность именно к данному виду. Так же может трактоваться встреча «крупных чаек с черными крыльями» на поле у с. Пышма 21 мая 1998 г.

Барабинская чайка *L. barabensis*. В дневниках обычно называется серебристой чайкой. Кочующие особи и небольшие группы встречаются по различным водоемам, отмечены на полях во время уборки многолетних трав. На оз. Шувакиш и пруду в с. Пышма наблюдались и в июне–июле, но признаков гнездования не отмечено.

Сизая чайка *L. canus*. Встречается на озерах Шувакиш, Шарташ, Верх-Исетском пруду и других водоемах, но всюду немногочисленна. Гнездится, по-видимому, отдельными парами или небольшими группами, на оз. Шувакиш отмечено также поселение этого вида в колониях озерной чайки.

Чёрная крачка *Chlidonias niger*. В небольшом количестве регистрировалась на прудах в с. Пышма (в отдельные годы гнездилась) и пос. Садовом, реже — на оз. Шувакиш.

Белокрылая крачка *Ch. leucopterus*. В дневнике обычно упоминаются «темные» крачки (при этом черные называются «своим» именем). На оз. Шувакиш в отдельные годы бывает в значительном количестве, очевидно, гнездится. О находке гнезда белокрылой крачки свидетельствует запись от 1 июня 1974 г. По несколько пар поселяется также на пруду в с. Пышма.

Речная крачка *Sterna hirundo*. Гнездится на оз. Шувакиш и прудах по р. Пышма, найдено несколько гнезд.

Вяхрь *Columba palumbus*. Судя по редким упоминаниям, весьма немногочислен. Сведения о гнездовых находках отсутствуют.

Клинтух *C. oenas*. Изредка отмечался по токовым крикам и визуально, в том числе возле деревьев с дуплами.

Сизый голубь *C. livia*. Обычен в городских и сельских населенных пунктах. Летом и осенью отмечены регулярные вылеты на поля. В зимнее время неоднократно наблюдали кормежку мелкими яблочками в уличных насаждениях, как это делают свиристели.

Горлица *Streptopelia sp.* Упомянуты единичные встречи горлиц, по голосу или визуальные. Вид при этом не уточняется.

Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus*. Обычна в лесных и пойменных местообитаниях.

Глухая кукушка *C. saturatus*. Встречается несколько реже обыкновенной.

Болотная сова *A. flammeus*. Наиболее часто, хотя и далеко не каждый год, регистрировалась на оз. Шувакиш и была добыта у этого водоема в сентябре 1951 г. Преобладают встречи в гнездовой период, однако других свидетельств гнездования не приводится. В октябре 1984 г. болотная сова, очевидно пролетная, отмечена в вечерних сумерках непосредственно над жилым районом города.

Мохноногий сыч *Aegolius funereus*. Редок, отмечен лишь трижды. В октябре 1976 г. встречен в окрестностях с. Пышма, в том же месяце 1995 г. — вблизи оз. Шувакиш, а 21 марта 1990 г. мохноногий сыч найден погибшим на лесной опушке у поля.

Воробьиный сыч *Glaucidium passerinum*. В дневниках дважды приведены свидетельства птицеловов, наблюдавших эту сову в октябре при ловле певчих птиц. В одном случае сыч, бросившийся на приманную чечетку, был отловлен.

Ястребиная сова *Surnia ulula*. На опушке горелого леса у оз. Шувакиш 29 июня 1989 г. наблюдали выводок из 5 или 6 птенцов. В ноябре того же года видели ястребиную сову на телеграфном столбе в окрестностях с. Пышма. В январе 1974 г. в пригородном лесу встречена сова, поедавшая добытую сороку.

Длиннохвостая неясыть *Strix uralensis*. Изредка регистрировалась в городе и его окрестностях — в апреле (1 встреча), сентябре (3) и декабре–феврале (4). Почти все совы обнаружены по окрикиванию воронами, в половине всех случаев — в городской черте: в парке, скверах и уличных насаждениях.

Бородатая неясыть *S. nebulosa*. Отмечалась несколько реже длиннохвостой — как в пригородных лесопарках, так и в городских насаждениях.

Обыкновенный козодой *Caprimulgus europaeus*. Отмечен в пригородных лесах.

Чёрный стриж *Apus apus*. Обычен на гнездовании в городе, поселяется также в дуплах дятлов по прилегающим лесам. Городские стри-

жи совершают регулярные кормовые вылеты в пригородную зону. Молодые из поздних выводков покидают гнезда нередко уже после отлета основной массы стрижей из района гнездования — во 2-й половине августа. В 1977 г. вылет слетка зарегистрирован 5 сентября.

Вертишейка *Jynx torquilla*. Обычна в пригородной зоне по лесным и пойменным насаждениям, неоднократно находили ее гнезда.

Седой дятел *Picus canus*. Зарегистрировано несколько встреч — осенью (в октябре–ноябре) и ранней весной (в марте) в Шувакишском лесопарке.

Желна *Dryocopus martius*. Немногочисленный гнездящийся вид пригородных лесов.

Большой пёстрый дятел *Dendrocopos major*. Наиболее обычен из дятлов, регулярно гнездится в пригородных лесах и лесопарках. Обычен и в зимний период, лишь в некоторые годы (в частности, зимой 1983/84 гг.), видимо, из-за неурожая семян хвойных практически отсутствовал и появился лишь в мае.

Белоспинный дятел *D. leucotos*. Немногочисленный вид, предпочитающий смешанные и лиственные насаждения.

Малый пёстрый дятел *D. minor*. В небольшом количестве почти ежегодно отмечался в пригородных лесах, неоднократно находили его гнезда.

Трёхпалый дятел *Picoides tridactylus*. Регистрировался спорадично: в некоторые годы встречался сравнительно регулярно, в другие — отсутствовал. Все встречи приурочены к осенне-зимнему периоду.

Береговая ласточка *Riparia riparia*. Немногочисленна. В начале июня 1979 г. около сотни береговушек отмечено над оз. Шувакиш — «летают парами и токуют». Сведения о гнездовых колониях отсутствуют.

Деревенская ласточка *Hirundo rustica*. Обычна на гнездовании в сельских населенных пунктах, реже встречается в городе. Осенью 2000 г. отмечена необычно длительная задержка отлета: группировка деревенских ласточек, первоначально — в несколько десятков птиц, держалась у слива из пруда в с. Пышма вплоть до конца 2-й декады ноября (Ляхов, Гусев, 2001).

Воронок *Delichon urbica*. В городском районе Уралмаш к концу XX столетия отмечено значительное сокращение величины гнездовых колоний, о чем свидетельствуют записи в дневнике: 1981 г. — «ласточек с каждым годом все меньше»; 1992 г. — «не видел ни одной ласточки, их гнезда заняли домовые воробьи»; 1997 г. — «остались единичные гнезда»; 2000 г. — «на бульваре 3–4 гнезда городских ласточек».

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*. Отмечен на пролете 15 октября 1990 г.

Полевой жаворонок *Alauda arvensis*. Обычен, гнездится на полях пригородной зоны. Отдельные пары отмечены также в черте города — на небольшом поле в районе Сортировки, более обычен был на аэродроме «Уктус».

Лесной конёк *Anthus trivialis*. Обычный гнездящийся вид пригородных лесов, отмечен также в городских парках и на кладбищах.

Луговой конёк *A. pratensis*. Отмечался в периоды сезонных миграций на болотах у оз. Шувакиш. В дневниках упомянут несколько раз под этим названием, в других случаях говорится о встрече «северных» коньков. На Среднем Урале к транзитным северным мигрантам относятся луговой и краснозобый коньки, несколько различающиеся сроками пролета (Коровин, 2001, 2004). По этому критерию «северные» коньки, отмеченные 2 октября 1976 г., 28 апреля 1979 г., скорее всего — луговые.

Краснозобый конёк *A. cervinus*. На весеннем пролете, в 3-й декаде мая, краснозобые коньки регистрировались на оз. Шувакиш — в подтопленных ивняках, прилегающих лесах. 23 мая 1979 г. отмечено их пение, что для пролетных коньков обычно не характерно.

Жёлтая трясогузка *Motacilla flava*. Обычна. Гнездится по сырым лугам и болотам вокруг оз. Шувакиш, поймам рек. Неоднократно находили ее гнезда.

Желтоголовая трясогузка *M. citreola*. Немногочисленна. Несколько раз отмечена в пойме р. Пышма, в том числе видели птиц с кормом.

Горная трясогузка *M. cinerea*. В небольшом количестве встречалась по характерным стациям — берегам небольших речек, насыпи строящейся в лесу дороги и т. п. Отмечали птиц с кормом.

Белая трясогузка *M. alba*. Весьма обычна как в городских, так и пригородных местообитаниях.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio*. Немногочисленный вид, поселяющийся по лесным опушкам, речным поймам, зарастающим вырубкам. Неоднократно находили его гнезда.

Серый сорокопут *L. excubitor*. Спорадически регистрировался в период с октября до середины декабря — по поросшим кустарником опушкам, выходящим к полям, и окраинам сел, заболоченным ивнякам у оз. Шувакиш. Отмечены попытки нападения серого сорокопута на приманных птиц на токах, во время которых удавалось отловить его тайником.

Обыкновенная иволга *Oriolus oriolus*. Немногочисленна, гнездится в лесопарках и лесах пригородной зоны. Найдено несколько гнезд.

Обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris*. Обычен. Гнездится как в скворечниках — по населенным пунктам, садовым участкам, так и

в дуплах дятлов, естественных полостях в стволах деревьев, по лесным опушкам.

Сойка *Garrulus glandarius*. Немногочисленна в лесах пригородной зоны, значительно более заметна в зимний период.

Сорока *Pica pica*. Весьма обычна в пригородных лесах, поймах рек, окрестностях сел и поселков. Гнездится и в городе: в парках и уличных насаждениях.

Кедровка *Nucifraga caryocatactes*. Изредка залетает в пригороды Екатеринбурга во время кочевок. Так, 2 особи встречены 23 октября 1971 г. в урочище Кирпичный Разъезд к северу от оз. Шувакиш.

Галка *Corvus monedula*. Обычный синантропный вид, гнездящийся в жилых и хозяйственных постройках. По крайней мере, часть галок зимует в городе.

Грач *C. frugilegus*. Регулярно залетает на городские окраины, в окрестности оз. Шувакиш. Ближайшие к городу гнездовые колонии периодически формировались в группах сосен и лиственниц по левому берегу Верх-Исетского пруда — в 1977 г. (у ж/д станции Электродепо), в 1982–1984 гг., в 1999 г. В 2001 г. появилась колония из 10–15 гнезд непосредственно в городе — у ж/д вокзала. Спорадически отмечались в городе единичные зимующие грачи (в частности, в январе 1983 г.).

Серая ворона *C. cornix*. Обычна, поселяется как в городе (парки, уличные насаждения), так и в пригородной зоне. В городе высокой численности достигает на зимовке.

Ворон *C. corax*. Постоянно обитает в пригородной зоне. Найдено несколько гнезд, наблюдались выводки.

Свиристель *Bombycilla garrulus*. Предпринимая кормовые кочевки, в осенне-зимний период регулярно появляется в городе и окрестных населенных пунктах. При неурожае плодов рябины быстро проходит эту территорию транзитом, в случае очень обильного урожая — как в городе, так и в естественных биотопах — прикочевка в города может сильно задерживаться, и свиристели появляются только к концу зимы — началу весны. В некоторые годы первых свиристелей отмечали уже в августе.

Крапивник *Troglodytes troglodytes*. Упоминаются 2 встречи в конце сентября — начале октября со ссылкой на вызывающих доверие знакомых птицеловов.

Лесная завирушка *Prunella modularis*. Гнездо лесной завирушки на молодой елочке, уже пустое, найдено 2 июня 1974 г. Это единственное упоминание вида за весь период наблюдений.

Таёжный сверчок *Locustella fasciolata*. Отмечена единственная

встреча: 22 июня 1967 г. в окрестностях оз. Вашты. К сожалению, не приведено никаких признаков, указывающих на принадлежность встреченной птицы к этому виду, в целом не свойственному данному региону.

Речной сверчок *L. fluviatilis*. Немногочисленный вид, заселяющий влажные и заболоченные древесно-кустарниковые насаждения.

Обыкновенный сверчок *L. naevia*. В дневниках сверчки почти всегда упоминаются под родовым названием, без указания вида. Из контекста очевидно, что речь в подавляющем большинстве случаев идет о речном. Лишь отдельные записи содержат сведения, позволяющие предположить встречу обыкновенного сверчка (например: «поет на сухом месте, падает в траву»).

Вертлявая камышевка *Acrocephalus paludicola*. Упоминаются три встречи: 7 июня 1963 г. на оз. Шувакиш; 22 августа 1987 г. на р. Пышма (выделен признак «рыжее надхвостье»); 16 июля 1975 г. в кустах на болоте найдено гнездо, предположительно, этого вида, с кладкой из 5 зеленоватых яиц с темными пятнами. Очевидно, что Ю. К. Гусев принимал серьезные попытки разобраться с такой сложной для полевого определения группой, как камышевки, что представляет весьма непростую задачу и для профессионалов. К сожалению, анализ признаков, лежащий в основе окончательного видового диагноза, остался за рамками дневников. Учитывая сложность полевого определения и острый дефицит качественных справочников-определителей, нельзя исключить ошибки в определении «трудных» видов, к которым, безусловно, относится и вертлявая камышевка.

Камышевка-барсучок *A. schoenobaenus*. Немногочисленна, встречается по заболоченным берегам оз. Шувакиш и р. Пышма. Найдены гнезда.

Индийская камышевка *A. agricola*. Дважды упоминаются встречи в тростниковых зарослях по р. Пышма: 23 мая 1997 г. и 26 мая 1998 г. Отсутствие сведений об этой камышевке в предыдущий период может отражать как спорадичность пребывания вида в районе наблюдений, так и постепенное возрастание опыта самого наблюдателя в определении этой сложной группы — камышевок.

Садовая камышевка *A. dumetorum*. Обычный гнездящийся вид. Поселяется в городских парках, пригородной зоне: по поймам рек, зарослям кустарника, куртинам густого подлеска.

Болотная камышевка *A. palustris*. Несколько раз отмечена по заболоченным берегам оз. Шувакиш и р. Пышма, соответственно в 1-й половине 60-х и начале 90-х гг. прошлого столетия. В 1970–1980-е гг. встречи отсутствуют.

Тростниковая камышевка *A. scirpaceus*. Упоминается несколько раз в предположительном контексте («пела индийская или тростниковая камышевка»), один раз более определенно говорится о пении тростниковой. С учетом удаленности ареала этого вида правильность его определения вызывает сомнения.

Дроздовидная камышевка *A. arundinaceus*. Гнездится в тростниковых зарослях на оз. Шувакиш и пруду на р. Пышма. Периодически регистрировалась в районе наблюдений с конца 1970-х гг., регулярно — в 1990-е гг. Уже после ледостава найдено гнездо этого вида в центре оз. Шувакиш.

Зелёная пересмешка *Hippolais icterina*. Немногочисленный гнездящийся вид городских парков, лесных насаждений пригородной зоны. Неоднократно находили ее гнезда.

Северная бормотушка *H. caligata*. Спорадически регистрировалась по околицам сел, лесным опушкам, заболоченным лугам с кустарником у оз. Шувакиш и р. Балтым, а также непосредственно в черте города: среди поля в районе Сортировки, в Сагайдак-парке. Найдено несколько гнезд.

Ястребиная славка *Sylvia nisoria*. Очень редка, вероятно, гнездится. Отмечена по беспокойству 10 июля 1992 г. на берегу оз. Шувакиш. В 2001 г. держалась на участке горелого леса у этого же озера.

Черноголовая славка *S. atricapilla*. Немногочисленна. Гнездится по приручьевым и пойменным уремам, участкам леса с развитым подлеском, в городских парках и кладбищенских рощах.

Садовая славка *S. borin*. Обычный гнездящийся вид городских парков, лесопарков и пригородных лесов.

Серая славка *S. communis*. Обычна на гнездовании в полуоткрытых местообитаниях: по лесным опушкам, речным поймам, окраинам сел.

Славка-завирушка *S. curruca*. Немногочисленный, регулярно гнездящийся вид городских парков и пригородных лесов.

Пеночка-весничка *Phylloscopus trochilus*. В небольшом количестве гнездится по городским паркам, кладбищенским рощам, лесопаркам и пригородным лесам.

Пеночка-теньковка *Ph. collybita*. Наиболее обычна среди пеночек — как в городских, так и пригородных лесных насаждениях.

Пеночка-трещотка *Ph. sibilatrix*. Регистрировалась с перерывами в несколько лет, начиная с 1970 г. Как правило, отмечали токование и пение самцов, в большинстве случаев, видимо, холостых. Лишь в некоторые годы (например, 1989, 1992) наблюдали длительное пение на стационарных участках, беспокойство, птиц с кормом, что указывает на спорадичное гнездование.

Пеночка-таловка *Ph. borealis*. Изредка регистрировалась по пению на весеннем пролете: трижды встречена в июне (в разные годы 8, 9 и 14 июня) и один раз — 24 мая.

Зелёная пеночка *Ph. trochiloides*. Обычна на гнездовании в городских парках и лесах пригородной зоны. Неоднократно находили ее гнезда.

Желтоголовый королёк *Regulus regulus*. Довольно обычен в осенне-зимнее время. Встречается небольшими группами или в составе смешанных синичьих стай. Гнездовые находки отсутствуют.

Мухоловка-пеструшка *Ficedula hypoleuca*. Сравнительно обычна в пригородных лесах различного типа, поселяется и в городских парках. Практически ежегодно находили ее гнезда.

Малая мухоловка *F. parva*. Очень редка. Дважды зарегистрирована по песне: 18 мая 1991 г. в урочище Насосная и 29 мая 2002 г. в городском парке района Уралмаш.

Серая мухоловка *Muscicapa striata*. Обычна, гнездится в лесах пригородов, лесопарках, городских парках.

Луговой чекан *Saxicola rubetra*. В небольшом количестве гнездится по влажным и заболоченным лугам с примесью кустарника.

Черноголовый чекан *S. torquata*. Поселяется на лугах, пустырях по окраинам сел. Возможно, этот же вид регистрировался в городе — на поле в районе Сортировки (в дневнике указано лишь «чекан»).

Обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe*. Не представляет большой редкости в характерных стациях пригородной зоны. Найдено гнездо в старой автопокрышке на поверхности земли.

Обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus*. Обычна как в пригородных лесах, так и городских насаждениях.

Зарянка *Erithacus rubecula*. Сравнительно обычна в прилегающем к городу лесопарке и пригородных лесах.

Обыкновенный соловей *Luscinia luscinia*. Регулярно гнездится по речным уремам, зарослям черемухи и ивы по берегам оз. Шувакиш и других водоемов.

Соловей-красношейка *L. calliope*. Отловлен знакомым птицеловом 25 мая 1992 г. на р. Мостовая в 30 км к северу от Екатеринбурга.

Варакушка *L. svecica*. Довольно обычна в кустарниково-луговых местообитаниях у оз. Шувакиш, по р. Пышма. Неоднократно находили ее гнезда.

Чернозобый дрозд *T. atrogularis*. Самец этого вида, очевидно полетный, встречен на очистных сооружениях 10 мая 1986 г. Птица подпустила очень близко, наблюдалась в течение 2 часов.

Рябинник *Turdus pilaris*. Обычен на гнездовании как в пригород-

ных лесах, так и городских парках. В последние десятилетия часть рябинников в городе и его окрестностях остается на зимовку. Впервые этот вид отмечен зимой 1969 г., а с середины 1970-х гг. регистрировался в зимнее время практически ежегодно. Численность и сроки пребывания зависят от запаса кормов: плодов рябины, боярышника, дикой яблони.

Белобровик *T. iliacus*. Обычный гнездящийся вид пригородных лесов, поселяется и в городских парках.

Певчий дрозд *T. philomelos*. Обычен в прилегающих к городу лесах.

Деряба *T. viscivorus*. Изредка отмечался на гнездовании в пригородных лесах и лесопарках.

Пёстрый дрозд *Zoothera dauma*. Очевидно, пролетная птица встречена в лесу близ ж/д станции Балтым (пос. Садовый) 14 мая 2001 г.

Длиннохвостая синица *Aegithalos caudatus*. В небольшом количестве регулярно гнездится в пригородных лесах. Неоднократно находили ее гнезда.

Буроголовая гаичка *Parus montanus*. Обычна на гнездовании в пригородных лесах.

Хохлатая синица *P. cristatus*. Район наблюдений находится на северо-восточной границе видового ареала (Степанян, 2003). На фоне колебаний численности происходит ее заметная пульсация: вид то весьма обычен, то исчезает на несколько лет. Так, во 2-й половине XX в. хохлатая синица не регистрировалась в 1969–1973, 1975–1976, 1980–1984, 1986–1989, 1991–1996 гг. Таким образом, наиболее регулярно она встречалась в 1960-е и конце 1970-х гг. и с перерывами до 5–6 лет в остальные периоды.

Московка *P. ater*. Сравнительно обычна на гнездовании в пригородных лесах и лесопарках.

Обыкновенная лазоревка *P. caeruleus*. Изредка появляется в районе наблюдений, чаще — в осенне-зимнее время. Наибольшее число встреч (3) зарегистрировано в мае и сентябре 1970 г. Признаков гнездования не отмечено.

Белая лазоревка *P. cyanus*. Сравнительно обычна в заболоченных лиственных лесах окрестностей оз. Шувакиш и по р. Пышма. Неоднократно находили ее гнезда.

Большая синица *P. major*. Обычна как в пригородной зоне, так и в городских парках. В населенные пункты в большом количестве привлекает на зимовку.

Обыкновенный поползень *Sitta europaea*. В небольшом количестве регулярно гнездится в пригородных лесах. У нескольких отлов-

ленных или наблюдававшихся на кормушках особей отмечены рыжевато-бурые бока (признак скандинавского подвида *S. e. europaee*). Судя по специальному акцентированию внимания на этом признаке, можно полагать, что встречались и птицы с его отсутствием, т. е., особи сибирского подвида *S. e. asiatica*.

Обыкновенная пищуха *Certhia familiaris*. Немногочисленный гнездящийся вид прилегающих к городу лесов. Неоднократно находили ее гнезда.

Домовый воробей *Passer domesticus*. Многочисленный вид г. Екатеринбург и окрестных населенных пунктов.

Полевой воробей *P. montanus*. Предпочитает городские окраины с частной застройкой, сельские населенные пункты, заселяет строения и скворечники на садовых участках, естественные дупла и щели в стволах по лесным опушкам.

Зяблик *Fringilla coelebs*. Обычен на гнездовании в пригородных лесах и городских парках. Единственный раз отмечен в зимнее время — на бурьяне у домов 6 декабря 1980 г.

Юрок *F. montifringilla*. В гнездовое время встречается в парках и пригородных лесах, численность колеблется по годам. Изредка одиночных выюрков отмечали в зимнее время: 10 января и 1 декабря 1979 г., 10 декабря 1983 г., 2 января 1990 г.

Обыкновенная зеленушка *Chloris chloris*. Довольно обычна в пригородных лесах, нередко поселяется в городском парке и уличных насаждениях с участием хвойных пород. В некоторые годы часть птиц, по-видимому, зимует: на птичьем рынке зимой постоянно появлялись «свежие» зеленушки.

Чиж *Spinus spinus*. Гнездится в лесах пригородной зоны, численность колеблется по годам.

Черноголовый щегол *Carduelis carduelis*. Довольно обычен в пригородной зоне, поселяется также в городских парках и рощах на кладбищах.

Коноплянка *Acanthis cannabina*. Встречается по околицам сел, прилегающим пустырям, выходящим к полям опушкам. В городе встречена в районе Сортировки, где в 1970-е гг. еще сохранялось небольшое поле, заросли кустарника и бурьяна.

Обыкновенная чечетка *A. flammea*. Регулярно встречается в городе и его окрестностях в осенне-зимний период. В отдельные годы, по-видимому, гнездится. Так, в весенне-летнее время (май–июль) регистрировалась в 1966, 1975, 1979, 1996 гг., но особенно заметна была в 1998 г., когда отмечали пение, спаривание, беспокойство, а в июле встречены молодые.

Обыкновенная чечевица *Carpodacus erythrinus*. Довольно обычна по речным поймам, поросшим кустарником опушкам в пригородной зоне, заселяет фрагменты подобных станций и в черте города (в частности, отмечена в районе Сортировки).

Урагус *Uragus sibiricus*. Во 2-й половине XX столетия происходило заметное расселение вида к западу. Хронология этого процесса прослеживается и по дневникам Ю. К. Гусева. Первое упоминание вида приводится в апреле 1964 г., когда пара урагусов появилась на птичьем рынке (правда, место их отлова не указано). В окрестностях оз. Шувакиш впервые встречен в ноябре 1970 г. Затем, после некоторого перерыва, уже регулярно (почти ежегодно) урагусы встречались с зимы 1978 г. Максимальное число встреч приходится на осенние месяцы (октябрь и ноябрь), к середине зимы частота их снижается и вновь возрастает в апреле. Птиц отмечали у озер Шувакиш и Шарташ, на бурьяне по окраинам сел, по ивнякам вдоль железной дороги, наиболее часто — в заболоченной долине р. Пышма с куртинами тростника и кустарника. Самое крупное скопление — около 50 особей — зарегистрировано в октябре 1988 г. на отстойниках водоочистных сооружений. По сведениям, полученным от птицеловов, гнездится в окрестностях города примерно с 1994 г.

Щур *Pinicola enucleator*. Периодически регистрируется в окрестностях Екатеринбурга на осенне-зимних кочевках, чаще в октябре–ноябре, изредка в зимние месяцы. Так, щуры наблюдались в 1976, 1978, 1990–1993, 1998, 2000 гг.

Клёст-сосновик *Loxia pytyopsittacus*. В дневниках имеется единственное упоминание: 1 октября 1969 г. в лесу встречены 3 клеста-сосновика.

Обыкновенный клёст *L. curvirostra*. Гнездится по окрестным хвойным лесам, численность существенно колеблется по годам. Особенно массовое «нашествие» клестов отмечено в 1967 г.

Белокрылый клёст *L. leucoptera*. Изредка регистрировались небольшие группы кочующих особей. За исключением одной встречи в 1976 г., все остальные приходятся на 1990-е гг.

Обыкновенный снегирь *Pyrrhula pyrrhula*. В город и его окрестности в значительном количестве прикочевывает в осенне-зимнее время. Летом регистрировался редко. В 1990-е гг. гнездо снегиря было найдено в городском парке района Уралмаш.

Обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes*. В некоторые годы регистрировался на зимовке в г. Екатеринбурге, реже в его окрестностях: по садовым участкам, в с. Пышма, на оз. Шувакиш. Основная часть встреч приходится на 80-е гг. прошлого столетия.

Обыкновенная овсянка *Emberiza citrinella*. Обычна на гнездовании в пригородной зоне. В отдельные годы зимует, особенно большие скопления — до 50–100 особей — отмечены у животноводческой фермы в с. Балтым.

Тростниковая овсянка *E. schoeniclus*. Гнездится по заболоченным берегам оз. Шувакиш с зарослями тростника и кустарниковых ив, пойме р. Пышма.

Овсянка-ремез *E. rustica*. В небольшом количестве встречается по заболоченным лиственным лесам, в частности, окружающим оз. Шувакиш. Неоднократно находили ее гнезда.

Дубровник *E. aureola*. Встречается в небольшом количестве по лугам в поймах рек и берегам озер. В 70-е гг. прошлого века отмечен и в черте города — в районе Сортировки.

Подорожник *Calcarius lapponicus*. Зарегистрирован на весеннем пролете — в апреле — в окрестностях с. Балтым.

Пуночка *Plectrophenax nivalis*. Пролетных пуночек отмечали в октябре, реже — в апреле, на оз. Шувакиш, очистных сооружениях, полях у с. Балтым.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Бельский Е. А., Ляхов А. Г. Орнитологические находки в Каменском районе Свердловской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 1995. С. 6–7.
- Бойко Г. В., Сысоев В. А. Интересные встречи птиц в Курганской, Челябинской и Свердловской областях // Там же. 2000. С. 46–48.
- Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю. Список птиц Российской Федерации. М., 2006. 256 с.
- Коровин В. А. Птицы биологической станции Уральского университета // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2001. С. 92–118.
- Коровин В. А. Птицы в агроландшафтах Урала. Екатеринбург, 2004. 504 с.
- Кузьмич А. А., Попов С. В., Таушканов Е. А. и др. Орнитофауна оз. Маян и его окрестностей // Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, 2005. С. 161–186.
- Ляхов А. Г., Гусев Ю. К. Длительная задержка осеннего отлета у деревенской ласточки *Hirundo rustica* // Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып. 2001. № 140. С. 321–322.
- Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири : справочник-определитель. Екатеринбург, 2008. 634 с.
- Стеланян Л. С. Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической общности). М., 2003. 808 с.